

感染予防のための ふき取り消毒の方法

～次亜塩素酸ナトリウム編～

適応 (インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症
ノロウイルス・ロタウイルス等感染性胃腸炎)

用意するもの

- ① 塩素系漂白剤
(キッチンハイターやキッチンブリーチなど、
次亜塩素酸ナトリウム約6%のもの)
- ② たらいやバケツ
- ③ 台ふきんやキッチンペーパー
- ④ ビニル手袋

方法

- ① ビニル手袋をする(手荒れ予防)。
- ② 水1リットルに対し、塩素系漂白剤を4ミリリットル入れ
0.02%液希釈液を作る。
(少量の場合は500ミリペットボトルにペットボトルの
キャップ半分の塩素系漂白剤を加える)
- ③ 希釈液を台ふきんやキッチンペーパーに含ませ軽く絞り、
消毒したい場所をふき取る。
- ④ 乾いたら、水拭きをする。金属は腐食するので2度拭き。
- ⑤ 台ふきんは②の液に5分間つけて消毒し水洗いする。

注意事項

- 粘膜(目やのど)への刺激がありますので、希釈液の噴霧は避けて下さい。
- 希釈液は、時間とともに有効塩素濃度が低下しますので、そのつど作ってください。
- 他の洗剤や液体と**混ぜない**でください。
- 0.02%希釈液は通常の消毒です。感染した(疑いのある)方がいる場合は、0.05%希釈液(水3リットルに対し塩素系漂白剤25ミリリットル、商品のキャップ1杯強)で消毒してください。